



Creșterea curcanilor

Magazine proprii: Oradea 0259-428075 / 0359-800206

Salonta: 0740-483326, Beiuș: 0728-172566, Diosig: 0728-172565

Tileagd: 0745-240977, Vadu Crișului: 0742-019239

Avantajele utilizării furajelor vivabio:

- *materii prime naturale
- *rețete performante, echilibrate optim nutrițional
- *conțin extracte naturale de plante
- *proteină vegetală cu digestibilitate ridicată
- *furajele vivabio nu conțin făinuri proteice animale, antibiotice sau alte substanțe interzise
- *furajele vivabio sunt fabricate și distribuite conform standardelor de calitate ISO 22000.
- *furajele granulate sunt consumate cu plăcere de către curcani
- *curcanii cresc deosebit de mari, sănătoși și au carne gustoasă

ADĂPOSTUL

- *Să fie curat, dezinfectat și încălzit înainte de sosirea puilor
- *Protecție împotriva rozătoarelor

AȘTERNUTUL

- *Se așează uniform talajul sau paie (uscate, curate) într-un strat de 10 cm.
- *Se amplasează hrănitorele și adăpătorile pe așternut (sub bec), acestea se vor ridica pe măsură ce puii cresc, pentru ca ei să poată consuma ușor apa și furajele. Înălțimea adăpătorilor și hrănitorelor va fi reglată astfel ca partea de jos a acestora să fie la nivelul spatelui puilor.

LUMINA

- *Se asigură cu ajutorul becurilor (și natural după 3 luni). Durata luminii va fi de 24 ore/zi în prima săptămână, apoi 23-24 ore/zi, putându-se ajunge la 14 ore/zi după 3 luni.

!Atenție: în primele 2 săptămâni puii de curcă nu se orientează prea bine, de aceea trebuie să-i ajutați să găsească hrănitorele și să consume hrană și apă.

FURAJAREA ȘI ADĂPAREA:

- *Hrănitorele și adăpătorile se vor amplasa sub sursa de lumină pentru a favoriza găsierea și consumul hranei.

- *0 - 4 săptămâni nutreț granulat vivabio NC 1610 STARTER CURCANI
- *4 - 8 săptămâni nutreț granulat vivabio NC 1620 CREȘTERE CURCANI I
- *8 - 12 săptămâni nutreț granulat vivabio NC 1630 CREȘTERE CURCANI II
- *după 12 săptămâni nutreț granulat vivabio NC 1640 FINISARE CURCANI sau concentrat CC 1000 + cereale măcinate

- *Apa se asigură la discreție, permanent proaspătă. Pentru a evita deteriorarea așternutului și udarea puilor vă recomandăm să folosiți adăpători destinate puilor, comercializate în magazinele de furaje.

TEMPERATURA

- *Se vor respecta întocmai temperaturile indicate în tabel, cu mențiunea că în primele 4 săptămâni nu se admit abateri de la valorile optime recomandate. Este important să folosiți becuri infraroșii (pe care le găsiți și în magazinele noastre), care încălzesc eficient puii și furnizează totodată intensitatea luminoasă optimă. Un bec infraroșu are 6000 ore de funcționare, deci o durată lungă de viață și un consum mic de energie, ceea ce înseamnă economie și eficiență.

!Becurile normale pentru iluminat nu asigură și temperatura optimă necesară puilor.

Utilizați becurile infraroșii, optime pentru încălzirea puilor.

Vârsta săptămâni	Greutate (kg)	Consum de furaj (kg)	Greutate (kg)	Consum de furaj (kg)
	Femele		Masculi	
1	0,15	0,15	0,16	0,15
2	0,35	0,44	0,38	0,48
3	0,64	0,90	0,73	1,03
4	1,03	1,56	1,22	1,86
5	1,53	2,42	1,86	2,98
6	2,14	3,53	2,65	4,44
7	2,83	4,90	3,56	6,23
8	3,59	6,50	4,56	8,34
9	4,39	8,23	5,63	10,71
10	5,21	10,14	6,77	13,35
11	6,03	12,21	7,94	16,23
12	6,84	14,43	9,14	19,34
13	7,64	16,76	10,35	22,65
14	8,41	19,21	11,57	26,15
15	9,16	21,77	12,77	29,86
16	9,88	24,44	13,95	33,77
20	12,38	35,61	18,53	51,13

Densitate recomandată		Vârsta săptămâni	Temperatura grade Celsius
Vârsta	Curcani/mp	1	34
0-7 zile	20	2	30
1-6 săptămâni	10	3	26
7-14 săptămâni	5	4	24
15-20 săptămâni	3	5	20
>20săptămâni	1-2	dupa 6	16

Tratamente și recomandări:

- *Asigurarea temperaturii optime indicată în tabel este obligatorie în primele 4 săptămâni.
- *Puii trebuie să aibă permanent aer curat, temperatura optima, furaj și apă la discreție.
- *Se vor urmări puii mult mai des în primele 7 zile, deoarece au tendința să se aglomereze (mai ales în colțuri) și în multe situații aglomerarea duce la moarte prin asfixie (în special noaptea dacă temperatura este prea mică).
- *Recomandăm utilizarea acidifiantilor în apa de băut, mai ales în primele 3 săptămâni.
- *În primele 14 zile recomandăm administrarea de vitamine în apa de băut sub forma de complex polivitaminic 1 ml/1 litru apă.
- *Puii de curcă se vaccinează contra Pseudopestei aviare la 10, 21 și 42 zile.
- *La aproximativ 2 luni de viață se recomandă un tratament preventiv antiparazitar, cu Enteroguard tablete, care se administrează 1 tabletă/3 kg viu, timp de 5 zile.
- *În cazul apariției unor semne de boală adresați-vă imediat unui medic veterinar sau la sediul firmei noastre, tel 0259-428.075.